

## PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII W ZNIECZULENIU

UWAGA - osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi:

W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych np. Acenocumarol, Sintrom, Clopidogrel, należy je odstawić w porozumieniu z lekarzem prowadzącym na około 7 dni przed datą badania i zamiennie podawać drobnocząsteczkową pochodną heparyny (np. Fraxiparyna, Clexane). W przypadku innych preparatów przeciwzakrzepowych (Acard, Polocard) ich odstawienie należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

UWAGA:

- 14 dni przed badaniem należy odstawić przyjmowane IPP (Controloc, Polprazol, Helides, Dexilant lub inny)
- 7 dni przed badaniem należy przerwać przyjmowanie preparatów żelaza

Do badania endoskopowego pacjent powinien pozostać bez jedzenia co najmniej 9 godz. i bez picia, przynajmniej przez 6 godzin. Na czas badania należy usunąć ruchome protezy zębowe.

⑩ Na badanie w znieczuleniu ogólnym, pacjent umawia się 21 dni przed wyznaczonym terminem gastrokopii na konsultację anestezyjologiczną ,wyłącznie telefonicznie 58 772 39 50 (infolinia),

⑩ Po badaniu w znieczuleniu konieczny jest obecność osoby towarzyszącej. Nie można prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać prac wymagających precyzji w ciągu 24 godzin od badania.